

本草蒙筌

本草蒙筌序

予少業舉子尋以體弱多病遂留意軒岐  
之術於凡三代以下諸名家有裨衛生者  
罔不遍閱精擇之迺知醫之為道與吾儒  
實相表裏而其理未始不一也故夫醫有  
素難猶吾儒之有六經也其  
儒之有雅誦訓詁也不觀爾雅無以達其  
立言之真言不讀本草無以盡素難之

病之玄機是故本草以老方藥之根柢醫  
學之指南也嘗悲世之醫者凡遇某病不  
察虛實三因刻曰古方以藥治効吾  
不逮古人而敢不遵耶殊不知病有標本  
久新治有逆從緩急醫貴通變藥在合宜  
苟執一定之方以應無窮之證未多虛  
實實損不足益有餘反致殺人者有矣安  
望以活人而撥厥所由碎示深知本草



爾然本草舊多有刻如犬鯢則意重寡要  
如集要則詞簡不該至於吾邑汪石山續  
集會編喜其詳畧相因工極精密矢惜又  
雜採諸家而訖無的取之論均未足以語  
完書也予嘗僑居郡城適從游者日益進  
思欲肇正元書以引來學而求免三者之  
弊乃取諸舊本會通而析衷之先之氣味  
降升有毒無毒次之純產優劣綜養稟賦

又次之諸經所行之而其製度其嚴  
留與夫治療之宜及諸名賢方書應驗者  
靡不殫述間亦旁採舊文竊附臆見以補  
未盡之旨且慮其繁而不整也為之砌輯  
章句排偶聲律重者刪略者補脗者取華  
者遺內附同種堪治者並錄書外續異名  
相類者加圈別首尾該貫纖悉者明其義  
增前其文咸舊俾讀者易記無齟齬之患


考者易尋免頽屑之勞初學由此日漸茂  
夫精微亦庶乎行遠升高一助也是書也  
創自嘉靖己未凡五易稿七閱歲而始成  
題其篇曰本學蒙筌以授諸弟子僉曰先  
生嘉惠後學之心盛矣豈惟以訓二三子  
須以公諸人人可也因請壽諸梓因述顛  
末以識歲月云

嘉靖乙丑春二月吉旦新安八十翁月朋陳

嘉謨長采序



萬曆元年孟秋月  
周氏仁壽堂刊行



本草蒙筌凡例

一書名蒙筌爲童蒙作也筌者取魚具也漁人得魚由於筌是書雖述舊章悉創新句韻叶易誦詞達即明俾童蒙習熟濟人卻病立方隨機應變亦必由此得爾故謂蒙之筌云

一卷首總論舊載甚繁今人厭目今惟舉其要領各立標題發明大意他如集要會編增附內經東垣諸書自有原本茲不復贅

一卷數次序悉宗集要規式元草部者書以本草名而藥莫多於草也次木部者木草類也次穀部菜部菓部者草木之餘也又獸部禽部蟲魚部



人部者塊然者不也。蠶乃人食。蠶蟲也。人需其物故終焉。

一部分品彙舊多混淆。今悉釐正。凡生植成株者木不成株者草。五加皮衛矛胡椒薑香莖並柔小不成株也。舊載木部。今改草部。根葉可啖者菜不可啖者草。生薑可啖者。舊載草部。今改菜部。紫蘇荆芥薄荷香薷藜蘆蜀葵。惟煎液潤頰以治病。非如菜之可啖也。舊載菜部。今改草部。子堪煮食者爲米粟粟子味甘能補。御米嘗名。舊載草部。今改穀部。實可生嗽者爲菓。草豆蔻味辛不和菓類。爰用舊載菓部。今改草部。龍眼郁李榧並屬菓類。編木

部似差改菓部也龍首本係鱗蟲編獸部欠當改  
魚部也伏異雖能飛鳴書匿夜出削禽部而錄蟲  
書陵經甲雖鱗似鯉穴土穿山削魚部而錄獸部  
餘無議者遵舊

一草木根莖花實枝葉禽獸臟腑筋骨皮毛凡可治  
療者並書殊字附系如不堪者問或有載字則黑  
書餘部倣此其或同種異名同名異種種異名異  
而治療同者舊雖另開今悉類附接續款後上別  
以圈

一藥品治療匪獨宗述經文其諸名賢註釋古今方  
書但載應病獲効雖佐不亦纂入不遺專啓童

多助多聞故也

一篇末漢安或竊附一已淺見或援引諸賢確言皆

擴末盡旨也降一字書者適尊經文此爲傳爾

一諸藥目錄惟標首者書名內雖附錄弗克盡贅凡  
欲搜考當以類求其圖別原有名者無分種類異  
同並書小字傍系

本草蒙筌目錄

總論

出產擇地土

收採按時月

藏留防耗壞

貿易辨假真

咀片分根梢

製造資水火

治寮用氣味

藥劑別君臣

四氣

五味

七情

七方

十劑

五用

修合條例

服餌先後

各經主治引使

用藥法象

卷一草部上

人參

黃耆

甘草

白朮木。有。

生乾地黃地。黃。地。黃。當。歸。

牛膝

黃精

遠志草。小。

石菖蒲

天門冬

麥門冬

五味子

菟絲子

靈芝草

甘菊花

石斛

薏苡仁

藟蘆即山。

知母

肉蓯蓉草。蓯。蓉。○。積。陽。○。

補骨脂

羌活○。獨。

柴胡○。臺。○。芸。

升麻

車前子

地膚子

決明子

疾藜子

藍實○。青。藍。○。青。布。

天麻○。赤。

蘭葉

蒲黃○。香。

卷石

何首烏

益母草

續斷

漏蘆

慈參

巴戟天

著實

五加皮

卷二草部中

芎藭○藤

芍藥

黃芩

黃連○連胡

桔梗○莖

積萎實○花天

貝母○龍睛

款冬○莖

紫苑○花女

馬兜鈴○青木

木香

大茴香○小茴香

香附子○草根

益智

縮砂密

草薺

肉苳蔻

白苳蔻

草豆蔻

藿香

高良薑○莖紅

胡椒○山胡椒

防風

防己

紫蘇

荊芥

白芷

細辛

麻黃

葛根

葳靈僊

藜蘆

藁本

薄荷

香薷香薷石

姜蕤女萎。女

泉耳實

天名精

防葵

蛇床子

草龍膽

澤瀉

瞿麥

通草脫。通

玄參

沙參

丹參

青箱子

木賊

惡實即牛

薇卿

敗醬

白薇

白前

白蔞

狗脊

菴蘭子

茵陳蒿

草蒿即青蒿○白蒿○柳蒿○牡蒿○

馬先蒿

茅根花○昔

僊茅

丹焦根焦○槌

景天

徐長卿

黃蘗根

石龍菊○敗

石龍芮

絡石○蛇薺○石血

三草部下

附子○烏頭○子○木鱉子○天

天南星

半夏

京三稜○黑三稜○三稜○

蓬莪茂

骨碎補

牡丹

大小薊

劉寄奴草

紅藍花○脂○

延胡索

欝金

薑黃



艾葉

地榆

紫草

茜草

馬鞭草

夏枯草

百部

百合

前胡

旋覆花

即金  
草

大黃

連翹

連翹

射干

篇蓄

苦參

牽牛子

葶藶

澤蘭

地黃  
○益

葫蘆巴

草薢

預知子

藜蘆

鵝蟲

酸醬寶

石常

○瓦

海金沙

海藻

○海帶  
昆布

常山

○蜀

其遂

白欬

白芨

白附子

白頭翁

商陸

王不留行

蒲公英

即草地

穀精草

旱蓮草

金星草

佛耳草

燈籠草

三白草

燈心草

花。灯

蛇含草

青。女

水紅草

即天葵。水。

白蔘

毛。蔘。

山茨菇根

山豆根

蒼耳根

即。耳。根。

盧根

狼根

芩根

羊蹄根

光花

桑。蜀。

莢花

貫衆

鳧茨

水萍

大戟

漆。澤。

蚤休

一名紫。河車草。

簡茹

草。

衛矛

一名。名。尼。

狼毒

淫羊藿

即。仙。

羊躑躅

藜蘆

莫音若落音子卿天

續音子子一名千

草麻子

華撥

鬼曰

乾苔井屋遊。給衣。昔聖。毛松。

鬼膏郵

蜀葵花黃蜀。大青音。

王瓜

卷四木部

桂。角桂。牡桂。官桂。木桂。筒桂。

栢實。素。側宿。黃蘗皮黃。檀。楮實。絲。

淡竹葉。敗船。茄。天竺。黃。竹。淫人。扶松。脂。松。白。氣。

茯苓神。炭。琥珀。堅。墨。

槐實。枳實。中。女貞實。白。黑。

棟實

即山楸子葉黃莢核

厚朴

桑根白皮

上。桑耳。桑花。桑上。生。厚根白皮。白皮。

榆皮

秦皮

木皮

海桐皮

山梔子

枸杞子

骨皮地

辛夷

酸棗

杜仲

山茱萸

合歡

接骨木

傷。槲。木。槿。

木槿

伏牛花

蔓荊實

牡荊實

荊

猪苓

紫葳

即凌霄花

南燭枝葉

烏藥

一名

茶茗

蜀椒

椒。秦椒。薑椒。薑。

吳茱萸

乾漆

生

鈎藤

檳榔

大腹

蜜蒙花

檳榔子

五倍子

巴豆

蘇方木

訶梨勒

皂莢

楓香脂

大楓子。白膠香。楓香。

麒麟竭

血竭名

沉香

。香。。。。。。。。。。。。

檀香

。。。。。

安息香

蘇合香

龍腦香

。。

膏

乳香

丁香

胡桐淚

阿魏

盧會

殭蠟

木鱉子

蘇美

雷丸

杉材

沒食子

。。

柳花

使君子

粳米○細不稟米○并○要○糯米○細不稟米○并○要○小麥米○○大麥米○○

蕎麥米○粟米○○黍米○○稷米○○新稷米○○

黑米○穀米○雜穀米○肉米○茨米○稗子○稗米○

粳米○生大豆○黃豆○赤小豆○白豆○豌豆○

黑豆○綠豆○白扁豆○白蔞豆○

白油麻○胡麻○一名巨勝火麻○

神麴○酒麴○酒麴○酒麴○紫醋○一名

醬○飴糖○漿水○

卷六菜部

冬葵子○生薑○白芥○白芥子○

紫芥○萊菔根○蕪菁○蔥○蔥實○

韭○韭黃○韭子○韭薹

葫即壽

甜瓜○西瓜

白冬瓜○越瓜○黃瓜

瓠音護○瓠子○瓠子

藟○藟

莢實○莢馬

胡荽

水蘄

卷七菜部

青橘皮○陳橘○桃核仁○桃兒杏核仁○杏

木瓜實

梅實○烏梅○梨○消梨○諸梨

大棗○棗○諸棗○柿○柿蒂○柿餅○柿

栗○諸栗

安石榴

桐子

荔枝肉

龍眼肉

榧赤菓

枇杷葉

郁李仁一名

蓮子石蓮

鷄頭○莢實

甘蔗沙。新。蔗。覆盆子。地。蔓。金。櫻。子。

山查子。葡萄。木。通。橄欖。

白菜谷。名。銀。杏。胡堯肉

卷八石部

玉屑玉。并。水。泉。瑪瑙。瑠。璃。玳。瑁。車。渠。瑤。

丹砂。粉。水。銀。珠。靈砂

雲母。起。石。陽。禹餘糧。石。中。黃。子。

紫白石。英。石膏。空。青。曾。青。綠。

。扇。青。膚。青。石膽。即。翠。磨。石硫黃

雄黃。雌。黃。赤石脂

凝水石。柳。石。石鍾乳。代。赭。石。



井泉石

花蓋石

青礫石

滑石

礬石。諸色白礬。

磁石。磁石。玄石。

石。燐。燕。石。地。石。毒。石。

無名異

金屑。金。諸金。石。

銀屑。銀。諸銀。石。

鉛。鉛。鉛。霜。胡。灰。粉。

赤銅屑。黃銅。自然銅。

鐵。鐵。鐵。鐵。針。砂。

蜜佗僧

朴硝。芒硝。風。英。硝。玄。明。粉。

砒礪

蓬砂。一名。

礪砂

食鹽。太。戊。陰。玄。精。石。

諸水

伏龍肝。電。突。墨。

諸上

石灰。冬。百。草。灰。電。內。熱。

泥。上。塵。尾。名。鳥。諸。塵。

卷九獸部

虎

○諸物

○虎骨

象牙

○諸物

酒汁

○肉

白馬脰

○諸物

○虎骨

牛黃

○諸物

○牛黃

驢屎

○諸物

○驢屎

○阿膠

○阿膠

○阿膠

○阿膠

○阿膠

猪膚

○諸物

○猪膚

野猪黃

○諸物

○野猪黃

○熊脂

○熊脂

○熊脂

○熊脂

○熊脂

鹿茸

○諸物

○鹿茸

犀角

○諸物

○犀角

○殺羊角

○殺羊角

○殺羊角

○殺羊角

○殺羊角

羴羊角

○諸物

○羴羊角

牡狗陰莖

○諸物

○牡狗陰莖

○狐陰莖

○狐陰莖

○狐陰莖

○狐陰莖

麝香

○諸物

○麝香

獺肝

○諸物

○獺肝

○溫肺

○溫肺

○溫肺

○溫肺

○溫肺

陵鯉甲

○諸物

○陵鯉甲

蛭

○諸物

○蛭

兔頭骨

○諸物

○兔頭骨

○兔頭骨

卷十禽部

丹雉

○諸物

○丹雉

雉

○諸物

○雉

○雉

○雉

○雉

○雉

白鴨屎

○諸物

○白鴨屎

野鴨肉

○諸物

○野鴨肉

○野鴨肉

○野鴨肉

○野鴨肉

○野鴨肉

鴈肪

○諸物

○鴈肪

鵠肉

○諸物

○鵠肉

○鵠肉

○鵠肉

○鵠肉

○鵠肉

○鵠肉

雀卵丁香

卷十一蟲魚部

伏翼明砂夜

蛤蚧

牡鼠

蟻姑

石蜜蜜糖

露蜂房

蚱蟬蟬花

五靈脂

玃猫

蝸牛蝸蟬

蠍

蛛絲網

木蜜蜜

白僵蠶原蠶

蠶絲湯

素螺蛳

蜈蚣

白頸蚯蚓

蟾蜍蟾

白蟻科

白花蛇諸色蛇

龜甲龜

鱉甲甲

鱉甲諸鱉

真珠石

蛤蚧車熬

文蛤海石

壯癯

瓦壘子

貝子

田螺

水蛭  
即馬  
螭

龍骨  
花  
稍

鯉魚

卷二

諸魚物。

鯽魚

魚魚魚魚

鰻鱺魚

牙○  
魚○  
鱗○  
繩○  
魚○

烏賊魚

海

河豚魚江

卷十二人部

紫河車

車の水戸

人乳汁

髮髮

髮○胎  
頭髮  
垢○  
○

百齒  
男  
陰  
毛

人牙齒

○人齒並の人津沫

人  
堯

中乾黃

○○

小兒疳。養。

地溝糞

人弱人

中輟  
白廼  
。清  
秋。

冊石

天靈蓋

灰。塩。屍。

澆棍汁

婦人經裡布襪

故屍枕

草部一百九十八種附名者八十種

木部七十一種附名者四十二種

穀部一十八種附名者三十四種

菜部一十六種附名者一十六種

菓部二十六種附名者八種

石部四十二種附名者四十四種

獸部二十一種附名者七種

禽部九種附名者七種

蟲魚部三十七種附名者三十五種

人部九種附名者二十二種

總共七百四十二種

本草蒙筌總論

山產擇地土

凡諸草木昆蟲各有相宜地產氣味功力自異尋常諺云一方風土養方民是亦一方地土出方藥也攝生之士寧幾求真多憚遠路艱難惟採近產克代殊不知一種之藥遠近雖生亦有可相代用者亦有不可代用者可代者以功力緩緊畧殊儻然加劑是去病不可代者因氣味純駁大異若妄餌反致損人故本經謂參耆維種異治同而芎歸則殊種各治足徵矣他如齊州半夏華陰細辛銀夏柴胡玄肅枸杞茅山玄胡索蒼朮懷慶乾山藥地黃款白朮綿黃耆上黨

參交趾桂。每擅名因地。故以地冠名。地勝藥靈。視斯益信。又宜山谷。若難混家園。所栽芍藥牡丹皮爲然。或宜家園者。勿雜山谷。自產菊花桑根皮是爾。云在澤。取滋潤澤傍。匪止澤蘭葉也。云在石。求清潔石上。豈特石菖蒲乎。東壁土及各樣土至微。用亦擬理。千里水。併諸般水極廣。烹必合宜。總不悖於圖經。纔有益於藥劑。書曰。慎厥始圖厥終。此之謂夫。

### 收採按時月

草木根梢收採。惟宜秋末春初。春初則津潤始萌。未充枝葉。秋末則氣汁下降。悉歸本根。今即事驗之。春寧宜早。秋寧宜遲。尤盡善也。莖葉花實四季隨宜採。未

老枝莖汁正充溢摘將開花並氣尚包藏實收已熟  
味純葉採新生力倍入藥誠妙治病方靈其諸玉石  
禽獸蟲魚或取無時或收按節亦有深義匪爲虛文  
並各遵依毋恣孟浪

### 藏留防耗壞

凡藥藏貯宜常隄防儻陰乾曝乾烘乾未盡去濕則蛙  
蝕黴垢朽爛不免爲殃當春夏多雨水浸淫臨夜晚  
或鼠蟲啗耗心力弗憚歲月堪延見爾久着火頻烘  
遇晴明向日旋曝塗造懸架上細膩貯罈中人參須  
和細辛冰片必同燈草本經云和糯米共煎麝香宜  
思子同藏耐不耗蝕蛇皮裹礪砂共菴豆收生薑擇老沙藏山藥候乾灰



膏沉香真檀香甚烈包紙須重爾水臘雪水至靈埋  
穿宜久類推偶反不在悉陳庶分兩不致耗輕抑氣  
味盡得完且辛烈者免走泄其美者無耗傷陳者新  
鮮潤者乾燥用斯主治何慮不靈

貿易辨假真

醫藥貿易多在市家辨認未精差錯難免諺云膏藥者  
兩隻眼用藥者一隻眼服藥者全無眼非虛語也許  
多欺罔累舉數端鍾乳令白醋煎細辛使直水漬當  
歸酒灑取潤枸杞蜜拌爲餅蝶蛸膠於桑枝蜈蚣硃  
其足赤此將反作好仍以假亂真齊危指人參大這  
混防已古壙灰云死龍骨首霜根謂土黃耆麝香搗

荔枝核攪霍香採加葉生。研石膏和輕粉收苦意當藥

花黃黃言鬱金土當稱獨滑小半夏黃黃爲玄胡索

嫩松梢鹽潤爲肉從容金通早銀鹽草豆蔻將草仁

克南木香以西呆抵煮雞子及鯖魚枕造琥珀熬廣

膠入蒼麥麵黠作阿膠杷把蒞代欬冬蠟脚骨捏虎

骨松脂攪麒麟竭雀硝揀龍腦香桑根白皮株幹者

豈貴牡丹根皮枝梗者安是如斯之類巧詐百般明

者竟叱其非庸下甘受其侮本資部病反致殺人雖

上天貴報於冥冥中然倉卒不能察實或誤歸咎於

用藥者之錯亦常有也此誠大關緊要非比小節尋

常務考究精詳辯認的實脩製治療庶免乖違

咀片分根梢

古人口咬碎故稱咀咀今以刀代之惟憑剉用猶曰咀片不忘本源諸藥剉時須要得法或微水滲或畧炙烘濕者候乾堅者待潤纔無碎末片片薄勻狀與花瓣相侔合成方劑起眼仍忌剉多留久恐走氣味不靈旋剉應人速能求効根梢各治尤勿混淆生苗向上者爲根氣脉行上入土垂下者爲梢氣脉下行中截爲身氣脉中守上焦病者用根中焦病者用身下焦病者用梢蓋根升梢降中守不移故也

製造資水火

凡藥製造貴在適中不及則功效難求太過則氣味反

失火製四有煨有炮有炙有炒之不同水製三或漬  
或泡或洗之弗等水火共製造者若蒸若煮而有二  
焉餘外製雖多端總不離此二者匪故巧弄各有意  
存酒製升提薑製發散入鹽走腎臟仍使軟堅用醋  
注肝經且資住痛童便製除劣性降下米泔製去燥  
性和中乳製滋潤回枯助生陰血蜜製甘緩難化增  
益元陽陳壁土製竊真氣驟補中焦麥麩皮製抑酷  
性勿傷上膈烏豆湯甘草湯漬曝並解毒致令平和  
羊酥油猪脂油塗燒成滲骨容易脆斷有剝去瓢免  
脹有抽去心除煩大藥具陳初淨熟玩

治療用氣味

治療貴方藥合宜方藥在氣味善用氣者天也氣有四  
溫熱者天之陽寒涼者天之陰陽則升陰則降味者  
地也味有六辛甘淡者地之陽酸苦鹹者地之陰陽  
則浮陰則沉有使氣者有使味者有氣味俱使者有  
先使氣後使味者有先使味後使氣者不可一例而  
拘有一藥兩味或三味者有一藥一氣或二氣者熱  
者多寒者少寒不爲之寒寒者多熱者少熱不爲之  
熱或寒熱各半而成溫或溫多而成熱或涼多而成  
寒不可一途而取又或寒熱各半晝服之則從熱之  
屬而升夜服之則從寒之屬而降至於晴日則從熱  
陰雨則從寒所從來類變化猶不一也仍升而使之

降須其抑也沉而使之浮須其載也辛散也其行之也橫其緩也其行之也上苦瀉也其行之也下酸收也其性縮鹹軟也其性舒上下舒縮橫之不同如此合而用之其相應也正猶鼓掌成聲沃水成沸二物相合象在其間也有志活人者宜於是而取法

### 藥劑別后臣

諸藥合成方劑分兩各有重輕重者主病以爲君輕者爲臣而佐助立方之法倣此纔靈往往明醫不踰矩度如解利傷風風宜辛散則以防風味辛者爲君白朮甘草爲佐若解利傷寒寒宜甘發又以甘草味甘者爲主防風白朮爲臣疹瘡寒熱往來若柴胡葛根

而佐陳皮白朮。血刺腹痛不已。君芍藥甘草。而佐當歸木香。大便秘瀉。茯苓炒白朮為主。芍藥甘草佐之。下焦濕盛。防己草龍膽為主。蒼朮黃柏佐之。眼暴赤腫。黃芩黃連君也。佐以防風當歸。小便不利。黃柏知母君也。佐以茯苓澤瀉。諸瘡疹。金銀花為主。多熱。佐梔子連翹。多濕。佐防風蒼朮。諸欬嗽。五味子為主。有痰。佐陳皮半夏。有喘。佐紫苑阿膠。如是多般難悉。援引。惟陳大要餘可例推。又况本草各條。亦以君臣例載。名雖無異。義實不同。彼則以養命之藥為君。養性之藥為臣。治病之藥為使。優劣均分。萬世之定規也。此則以主病之藥為君。佐君之藥為臣。應臣之藥為

使重輕互舉。一時之權宜也。萬世定規者。雖前聖後起。猶述舊弗違。一時權宜者。固後學當宗。資通變。毋泥醫家活法觀。此可知。

### 四氣

凡稱氣者是香臭之氣。其寒熱溫涼。是藥之性。且如鴉條中。云白搗脂性冷。不可言其氣冷也。况自有藥性。論其四氣。則是香臭臊腥。故不可以寒熱溫涼配之。如蒜。阿魏。鮑魚。汗襪。則其氣臭。鷄魚。膽蛇。則其氣腥。狐狸。腎。白馬。莖。近陰。麝。人中白。則其氣臊。沉。檀。腦。麝。則其氣香。如此方。可以氣言之。其古本序例中。併各條內氣字。恐或後世誤書。當改爲性字。于義方允。仍



寒熱溫涼四性五味之中，每一味各有此四者。如辛之屬，則有硝石、石膏、乾薑、桂、附、半夏、細辛、薄荷、荊芥之類；甘之屬，則有滑石、渴水、石飴、飴酒、棗、參、耆、甘草之類；粳米之類，酸之屬，則有商陸、苦酒、硫黃、烏梅、五味子、木瓜、芍藥之類；苦之屬，則有大黃、枳實、厚朴、酒糯米、白朮、麻黃、竹茹、梔子之類；鹹之屬，則有澤瀉、犀角、陽起石、皂莢、文蛤、白華水、蛭、牡蠣之屬。此雖不足以盡辛，大抵五味之中，皆有四者也。

### 五味

天地既判，生萬物者，惟五氣耳。五氣定位，則五味生。五味生，則千變萬化，不可窮已。故曰：生物者，氣也。成之

者味也。以奇生則成而耦以耦生則成而奇。寒氣堅故其味可用以熨熱氣熨故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者中氣所生無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣。肺熨則和故酸可以養筋。骨收則強故酸可以養骨。筋散則不舉故辛可以養筋。肉緩則不墜故甘可以養肉。堅之而後可更收之而後可散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣治疾者不通乎此而能已人之疾者吾未之信焉。

七情

有單行者不與諸藥共劑而独能攻補也如方書所載

獨參湯獨桔湯之類是爾有相須者二藥相宜可兼用之也有相使者能爲使卒引達諸經也此二者不必同類如和羹調食魚肉葱豉各有宜合共相宣發是爾有相惡者彼有毒而我惡之也有相畏者我能而彼畏之也此二者不深爲害蓋我雖惡彼彼無忿心彼之畏我我能制伏如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良黃耆畏防風而黃耆得防風其功愈大之類是爾有相反者兩相讐隙必不可使和合也如畫家用雌黃胡粉相近便自黯妬粉得雌則黑黃得粉亦變之類是爾有相殺者中彼藥毒用此即能殺除也如中蛇虺毒必用雄黃中雄黃毒必用防已之

類是爾凡此七情共劑可否一覽即瞭然也或云藥有五味以通五臟肝藏魂而有怒一也肺藏魄而有憂二也心藏神而有喜三也脾藏意與智而有思五也腎藏精與志而有恐七也五味以治五臟通有七情也

### 七方

大君一臣三佐九制之大也

其用有二一則病有兼證邪氣不專不可以一二味治之宜此大方之類是也二則治腎肝在下而遠者宜分兩多而頓服之是也

小君一臣二佐四制之小也

其用有二。一則病無兼證。邪氣專一。不可以多味治之。宜此小方之類是也。二則治心肺在上而近者。宜分兩少而頻服之是也。

緩 治主當緩補上治上制以緩凡表裏汗下皆有所當緩緩則氣味薄薄者則頻而少服也。

其用有五。有茸以緩之爲緩方者。蓋糖蜜棗茯苓之類。取其戀膈故也。有朮以緩之爲緩方者。蓋朮比湯散蒸力行遲故也。有品味群衆之緩方者。蓋藥味衆多。各不能騁其性也。有無毒治病之緩方者。蓋藥無毒。則攻自緩也。有氣味薄之緩方者。蓋氣藥味薄。則常補上。比至其下。藥力已衰。此補上治上之法也。

急 治客當急補下治下制以急凡表裏汗下皆有所當急急則氣味厚厚者則頻而多服也

其用有四有熱盛攻下之急方者謂熱燥前後閉結譫妄狂越宜急攻下之類是也有風淫踈滌之急方者謂中風口噤不省人事宜急踈滌之類是也有藥毒治病之急方者蓋藥有毒攻擊自速服後上涌下瀉奪其病之大勢者是也有氣味厚之急方者蓋藥氣味厚則直趨下而力不衰此補下治下之法也

奇 君一臣二奇之制也近者奇之下者奇之凡在陽分者皆爲之奇也

其用有二有藥味單行之奇方者謂獨參湯之類是

也有病近而宜用奇方者謂君一臣二君二臣三數合於陽也故宜下之不宜汗也

王安導曰奇方力下而微九下宜奇者則藥毒內攻太過也

偶 君二臣四偶之制也遠者偶之汗者偶之凡在陰分者皆爲之偶也

其用有三有兩味相配之偶方者謂沉附湯之類是也有兩方相合之偶方者謂胃苓湯之類是也有病遠而宜用偶方者謂君二臣四君四臣六數合於陰也故宜汗之不宜下也

王安導曰偶方力齊而大凡外發不足也

奇與偶有味之奇偶有數之奇偶並當察之則不失

其寒溫矣

天之陽分爲奇。假令升麻湯升而不降也。亦謂之奇。以其在天之分也。

汗從九地之下。假令自地而升天。非苦無以至地。非溫無以至天。故用苦溫之劑。從九地之下。發至九天之上。故爲之偶。

地之陰分爲偶。假令調胃承氣湯降而不升也。亦謂之偶。以其在地之分也。

下從九天之上。假令自天而降地。非辛無以至天。非涼無以至地。故用辛涼之劑。從九天之上。引至九地之下。故爲之奇。



復 奇之不去復以偶偶之不去復以奇故曰復復者  
再也重也。潔古云十補一瀉數瀉一補所以使不失  
通塞之道也。

其用有二。有二三方相合之爲復方者。如桂枝二越  
婢一湯之類是也。有分兩勻同之爲復方者。如胃風  
湯各等分之類是也。又曰重複之復二三方相合而  
用也。反復之復謂奇之不去則偶之是也。

十劑

宣 可去壅滯。屬是也。故藟壅不散宜宣劑以散  
之。有積痰上壅有積瘀上壅有積食上壅有積  
飲上壅。

宣漢之制也。經曰：高者因而越之。又曰：木鬱則達之。以病在上而湧吐之也。若瓜蒂散、葶藶湯、人

參、蘆根、

通

可去滯。通草防已之屬是也。故留滯不行，宜通劑

以行之。此中諸有

痺留也。飲留也。痛亦留也。

通草通之劑也。如小便便滯而不通，宜通草、琥珀、海

金沙之屬。月經帶而不通，紅花、桃仁、五靈脂之屬

補

可去弱。人參、羊肉之屬是也。經曰：故羸弱不足，宜

補劑以扶之。

有氣弱，有血弱，有氣血俱弱。

補劑滋補之劑也。不足為虛。經云：虛則補之。如氣虛

用四君子湯，血虛用四物湯，血俱虛用八珍。十全

大補之屬。又云：精不足者，補之以味。蓋藥味酸苦

甘辛酸各補其臟，故此為云。雖然，善藥生者使病

瀉 可去閉葶大黃之屬是也故閉結有餘宜瀉劑

以下之 有閉在表有閉在裏有閉在中

瀉世瀉之劑也有餘為實經曰實則瀉之實則散之如大小承氣湯大柴胡湯之屬

滑 可去著冬葵子榆白皮之屬是也故澀則氣著宜

滑劑以利之 有經澀有小便澀有大便澀

滑滑利之劑也周禮曰滑以養察如大便結燥小便澀澀用大麻仁郁李仁冬葵子滑石之屬

澀 可去脫牡蠣龍骨之屬是也故滑則氣脫宜澀劑

以收之 前脫者遺尿後脫者遺尿陽脫者自汗

陰脫者失精失血

澀收斂之劑也如大便秘澀宜肉豆蔻訶子之屬小便勤通宜桑螵蛸益智之屬冷汗不禁宜黃耆

麻黃根之屬精遺不固宜龍骨牡蠣之屬血崩不止宜地榆阿膠之屬

燥

可去濕桑白皮赤小豆之屬是也桑豆亦可去濕

重宜燥劑以除之

有濕在上有濕在中有濕在

下有濕在經有濕在皮有濕在裏

燥除濕之劑也如夾食致濕停飲成痰宜桑白皮木茯苓半夏之屬除水飲之劑也

大腹皮赤小豆之屬又沉寒痼冷之症不可用也良姜附子川椒之屬非積寒冷之症不可用也

濕可去枯紫石英白石英之屬是也故古則為燥宜

濕劑以潤之

有藏氣而枯有藏血而枯

濕潤燥之劑也與滑品藥若不同經曰辛以潤之蓋辛能散氣能化液故也若夫硝石性雖鹹本

屬真陰之水試問藥之要藥人有枯渴數揭之病能獨金化為然亦有火化乘之非濕劑莫能愈也

重可去怯磁石鐵粉之屬是也故怯則氣浮宜重劑

以鎮之

神志失守驚悸不寧

重鎮固之劑也如小兒急驚心神昏胃宜金銀箔  
硃砂丸之屬傷寒下利不止心下痞硬利在下焦  
宜赤石脂禹  
餘糧湯之屬

輕可去實麻黃葛根之屬是也故實而氣蘊宜輕劑

以揚之

腠理閉悶噎塞中蘊

輕散揚之劑也如寒邪客于皮膚頭寒  
身熱無汗宜麻黃湯升麻葛根湯之屬

五用

湯

煎成清液也補須要熟利不熾生並先較定水數

煎銍多寡之不同耳去暴病用之取其易升易散易  
行經絡故曰湯者盪也

治至高之分加酒煎去濕加生薑煎補元氣加大棗

煎發散風寒加葱白煎去膈病加蜜煎止痛加醋煎

凡諸補湯渣滓兩劑併合加原水數復煎待熟飲之  
亦敵一劑新藥其發表攻裏二者惟煎頭藥取効不  
必煎渣也從緩從急之不同故爾

膏熬成稠膏也藥分兩須多水煎熬宜久渣滓復煎  
數次絞聚濃汁以熬成爾去久病用之取其如飴力  
太滋補膠固故曰膏者膠也

可服之膏或水或酒隨熬滓酒煮飲之可摩之膏  
或油或醋隨熬滓宜搗敷患處此蓋盡盡藥力也

散研成細末也宜旋製合不堪久留恐走泄氣味服  
之無効爾去急病用之不循經絡只去胃中及臟腑  
之積故曰散者散也

氣味厚者白湯調服氣味薄者煎熟和粗服

丸 作成圓粒也治下焦疾者如梧桐子太治中焦疾者如菡豆大治上焦疾者如米粒大因病不能速去取其舒緩遂旋成功故曰丸者緩也

用水丸者或蒸餅作稀糊丸者取至易化而治上焦也用稠麵糊丸者或飯糊丸者取畧遲化能達中焦也或酒或醋丸者取其收散之意犯半夏南星欲去濕痰者以生薑自然汁作稀糊爲丸亦取其易化也神麴糊丸者取其消食山藥糊丸者取其止澁煉蜜丸者取其遲化而氣循經絡蠟丸者取其難化能固護藥之氣味勢力全備直過格而作効也

漬酒 漬者藥酒也。藥須細剉，絹袋盛之，入酒罐密封。如常法煮，熟地埋日久，氣烈味濃。蚤晚頻吞，經絡速達。或攻或補，並著奇功。滓漉出，曝乾微搗末，別漬。力雖稍緩，服亦益人，爲散亦佳。切勿傾棄。

補虛損證，宜少飲，旋取效。攻風濕證，宜多飲，速取效。

### 修合條例

古之方劑，鎰銖分兩，與今不同。云一升，即今之大白盞也。云兩鎰，蓋六銖爲一分，即今二錢半。二十四銖爲一兩也。云三兩，即今之二兩。云一兩，即今之六錢半。凡散藥有云刀圭者，十分方寸七之一。准如梧子大也。六寸七者，作七。正方一寸，抄散取不落爲度。錢五七



者今五銖錢邊五字者以抄之一撮者四刀圭也十撮爲一勺

凡丸藥云如細麻者即胡麻也如黍粟亦然以十六黍爲一大豆如大麻子者佳三細麻也如胡豆者即今青斑豆也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆如大豆者以二小豆准之如梧桐子者以二大豆准之凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大畧二十兩藥用水一斗煮取四升以此爲准然利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁

凡湯中用芒硝飴糖阿膠須候湯熟絞淨清汁方納于內再上火兩三沸烺盡乃服

凡湯中加酒醋童便竹瀝薑汁亦候湯熟絞汁盞內加  
入便服

凡湯中用沉香木香乳香殍藥一切香竄藥味須研細  
末待湯熟先傾汁小盞調服訖然後盡飲

凡丸散藥亦先咀細片曝燥纔依方派輕重稱淨分兩  
和勻共磨細末其天門冬地黃輩濕潤難乾者冬春  
畧增餽數搗膏攪入夏秋亦同衆藥曝燥磨之

凡篩丸藥末用重密絹令細若篩散草藥用輕疎絹其  
丸藥中有各研磨者雖已篩細和諸藥末又必重複  
篩過庶色理和同爲佳

凡丸藥用蜜每藥末一斤則用蜜十二兩文火煎煉掠

去沸沫令色焦黃滴水成珠爲度再加清水四兩和勻如此丸成庶可曝乾經久不爛

凡藥末入蜜和勻須令力士於石臼內杵搗千百自然軟熟容易丸成不然或散或粘在手弗妙一應作糊合者亦做此式勿違

凡通大便丸藥或有巴豆或加硝黃丸成者必用川蠟熔化爲衣取其過膈不化能達下焦脾胃免傷誠爲良法儻人體氣壯實毋以此拘

凡丸藥或用硃砂末或用金銀箔爲衣飭者必須丸成乘濕粘上

凡病在胃脘以上者先食後服藥病在心腹以下者先  
 服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在  
 骨髓者宜飽滿而在夜在上者不厭頻而少在下者  
 不厭頻而多少服則滋藥于上多服則峻補于下  
 各經主治引使

治寒

肝氣吳茱萸  
血當歸

心氣桂心  
血同

脾氣吳茱萸  
血同

肺氣麻黃  
血乾薑

腎氣細辛  
血滑子

膽氣生薑  
血川芎

大腸氣白芷  
血秦艽

小腸氣茴香  
血玄胡

三焦氣附子  
血川芎

膀胱氣麻黃  
血桂枝

包絡氣滑子  
血川芎

治熱

肝氣柴胡  
血黃芩

心氣麥門冬  
血黃芩

脾氣芍藥  
血生地黃

肺氣石膏  
血梔子

腎氣玄參  
血黃芩

膽氣連翹  
血柴胡

胃氣大黃根

三焦氣連翹

膀胱氣黃柏

大腸血連翹黃

小腸血赤茯苓

包絡血麥門冬

治勞

肝柴胡

心生地黃

脾白芍藥

療熱

肺桑白皮

腎生地黃

膽柴胡

胃石膏

三焦石膏

膀胱澤瀉

大腸大黃

小腸赤茯苓

治風

肝川芎

心細辛

脾杜仲

肺防風

腎獨活

胃升麻

三焦黃芪

膀胱羌活

大腸白芷

小腸藁本

包絡川芎

治濕

肝白朮

心黃連

脾白朮

肺 桑白皮

腎 澤瀉

胃 白朮

三焦 陳皮

膀胱 茵陳

大腸 秦艽

小腸 車前

包絡 苓

治燥

肝 當歸

心 麥門冬

脾 麻仁

肺 杏仁

腎 柏子仁

三焦 山藥

膀胱 茴香

大腸 硝石

小腸 茴香

包絡 薤仁

用藥法象

形 金木水火土

真假

輕枯虛薄緩淺假宜治上

色 青赤黃白黑

深淺

重潤實厚急深真宜治下

性 寒濕溫涼平

急緩

其中平者宜治中餘隨藏

時

辛酸鹹苦甘

厚薄

府所宜處方

體

虛實輕重平

枯潤

本草蒙筌卷之一

新安祁門月朋陳嘉謨拜采 纂輯

門生

歙邑葉斐

鮑倚

校刊

婿胡一貫

姪晨

草部上

人參

味甘氣溫微寒氣味俱輕升也陽也陽中微陰

無毒東北境域有陰濕山谷生詳文載高麗國誌讚云

三椹五葉物生三椹小者一椹五葉年久漸背陽向陰欲

來求我假音樹相尋日陰農故多生樹底種類畧殊

形色第一紫大稍扁出潞州紫團山

假參俗呼羊白堅且圓出邊外百濟國今臣屈



生遼東遼東地名上黨古郡名在冀州西南有鬚梢纖長

**參**俗呼近紫體虛亞黃味薄並堪主治須

別龍良獨黃參功効易臻人啣走氣息自若

上黨參令一人啣之人不啣同走里肖人形神

許不啣者必喘者氣息自若此為真也肖人形神

具難得而人參之名亦因相類雞腿力洪公

云凡使大塊輕匏取春間因汁升萌芽抽梗春多

一兩不如重實採秋後得汁降結暈成膠布金井玉

闌入方劑極品和細辛留久不蛀每參一斤和細辛

未不去蘆梗吐薄纔煎反藜藜蒸五靈脂諸

虛煎調五臟俱補肥白人任多服蒼黑人宜少投溪

云肥白氣虛蒼黑氣實然考醫案中證虛色健厚理

中生津止渴開心益志明目輕身卻驚悸除夢邪消  
胃脇逆滿養精神安魂魄甦心腹鼓疼腸胃積冷溫  
平霍亂吐瀉止息定喘嗽通暢血脉瀉陰火陰虛生  
一說陽氣下陷陰分而生熱也甘溪言瀉陰火者非  
瀉助火邪正謂虛火可補龍火又言補中有瀉意也  
今恐讀者不能解悟認假為真茲補元陽黎古云補  
故直書與下文相貫使毋惑云  
上焦元氣而瀉脾肺胃中火邪升麻為引補下焦元  
氣而瀉腎中火邪茯苓為使東垣曰人參黃耆甘草  
三味退虛火聖藥也丹溪治外感挾內傷證但氣虛  
熱甚者必與黃耆同用托住正氣仍恐性緩不能速  
達少加附子資其健悍之性以助成功是知火與元  
陽勢不兩立一勝一負輒用臣扶經曰邪所湊正必

虛是爾爾發吐痰沫善歐味總甘和緩不峻虛音老弱膈壅煎宜衍義亦云難服藜蘆用此可代

葉按藥要註曰肺受寒邪短氣少氣虛喘宜用肺受火邪喘嗽及陰虛火動勞嗽吐血勿用蓋人參入手太陰而能補火故肺受火邪者忌之王氏此言迺述海截肺寒用人參肺熱用沙參及後好事者假名東垣輯成括曰肺寒則可服肺熱還傷肺東垣既云眼後人假名也豈踵其遺轍亦引寒熱對復語云安知寒熱之中猶有虛實之別也肺中實熱忌之固宜肺中虛熱用之何害况丹溪云虛火可補參耒之類是也又曰龍火及治夫龍火者乃空中

龍雷之火即虛火也。在人身雖指下焦相火為云。然而上下同法。肺中虛火亦相侔焉。此火非水可撲。每當濃陰驟雨之時。火焰愈熾。或擊碎木石。或燒毀房屋。燔灼酷烈之勢。誠不可抗。太陽一照。火自消彌。可見人身虛火。無問上中下三焦之殊。但證有見於外。必非寒涼助水之藥可制。務資此甘溫補陽之劑。補足元陽。則火自退。爾補中兼瀉瀉中有補。正經所謂溫能除大熱是也。矧斯議者。匪特丹溪獨知。如前潔古東垣俱謂能瀉火者。亦因洞燭此理。輒言之真切。用之的確。如山石而不移焉。王氏弗知。參能瀉火之邪。反畏補火為忌。惟引

以字異  
本作能

寒熱不辯實虛妄著示人深可晒也大抵人參補  
虛虛寒可補虛熱亦可補氣虛宜用血虛亦宜用  
雖陰虛火動勞嗽吐血病久元氣虛甚者但恐不  
能抵當其補非謂不可補爾苟以王氏之言為拘  
則前王氏生者亦何屢用而不忌乎如張仲景治  
亡血脈虛非不知動火也用此而補謂氣虛血弱  
補氣則血自生陰生于陽并能生血故也葛可久  
治癆瘵大吐血後亦非不知由火載血上也用此  
一味煎調而命名曰獨參湯蓋以血脫須先益其  
氣爾丹溪治勞嗽火盛之邪製瓊玉膏以之為君  
或此單熬亦曰人參膏類服後肺火反除嗽病漸

愈者又非虛火可補。龍火反治之驗歟。抑不特此而已。古方書云。諸痛不宜服參耆。此亦指暴病氣實者而言。若久病氣虛而痛。何嘗拘于此耶。東垣治中湯。同乾薑。用治腹痛吐逆者。亦謂裏虛則痛。補不足也。是以醫家臨病用藥。實在察證虛實為先。當減當加。自合矩度。匪但病者不懼夭枉之殃。而在已亦得以免殺。人不用刃之咎矣。

**黃耆**

味甘。氣微溫。氣薄。味厚。可升。可降。陰中陽也。無

毒。種有三品。治無兩般。本耆。莖短理橫。功力殊劣。此

下缺。歲多收。倍用。煎服亦宜。本經不載。州土必出黃

賤。自產穀田。亮年。多收亦可代糧也。生白水。赤水。二鄉。白水

頗勝此品為編出山西沁州綿上鄉名有此品極佳

此品為編因地產無名須待秋採入藥久留易蛀勤曝

難侵務選卑股不崢直如箭幹皮色褐潤肉白心黃

折柔軟類綿嚼甘甜近蜜如斯應病獲効如神市多

採苜蓿根假充謂之土黃者蘇利殊不知此堅脆音

味苦能令人瘦者柔軟味甘易致人肥每被亂真尤

宜細認夫耆者惡白鮮龜甲製去頭刮皮生用治癰

疽蜜炙補虛損入手少陽手足太陰主丈夫小兒五

勞七傷骨蒸體瘦消渴腹痛瀉痢腸風治女子婦人

月候不勻血崩帶下胎前產後氣耗血虛益元陽瀉

陰火扶危濟弱畧亞人參溫分肉而充皮膚肥腠理

以司開闔固盜汗自汗無汗則發有汗則止托陰瘡  
癰瘡排膿止痛長肉生肌外行皮毛中補脾胃下治  
傷寒尺脉不至是上中下內外三焦藥也性畏防風  
而防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大蓋相畏而  
相使者故二味世多相須而用衍義又云因多補益  
之功藥中呼為羊肉久服勿已耐老延年

藥按參耆甘溫俱能補益證屬虛損堪並建功但  
人參惟補元氣調中黃耆兼補衛氣實表所補既  
畧差異共劑豈可等分務尊專能用為君主君藥  
宜重臣輔減輕君勝乎臣天下方治臣強于主國  
祚漸危此理勢自然藥劑倣之亦不可不注意也



如患內傷脾胃衰弱飲食怕進怠惰嗜眠發熱惡寒嘔吐泄瀉及夫脹滿痞塞力乏形羸脉急虛微精神短少等證治之悉宜補中益氣當以人參加重為君黃耆減輕為臣若係表虛腠理不固自汗盜汗漸致亡陽併諸潰瘍多耗膿血嬰兒痘瘡未灌全漿一切陰毒不起之疾治之又宜實衛護榮須讓黃耆倍用為主入參少入為輔焉是故治病在藥用藥由人切勿索驥按圖務須活潑潑地先正嘗曰醫無定體應變而施藥不執方合宜而用又云補氣藥多補血藥亦從而補氣補血藥多補氣藥亦從而補血佐之以熱則熱佐之以寒則寒

如補中益氣湯雖加當歸當歸血藥也因勢其  
被參者所據故專益氣愈名又當歸補血流經信  
黃耆黃耆氣藥也為性緩亦隨當歸所引惟以補  
血標首佐肉桂附子少熱八味丸云然加黃藥知  
母微寒補陰丸是爾舉隅而反觸類而推則方藥  
之應乎病機病機之合平方藥總在君臣佐使之  
弗失纔致輕重緩急之適中時醫不以本草加工  
欲望製方如是之通變合宜者正猶學射而不操  
夫弓矢其不能也決矣

**甘草**

味甘氣平生寒炙溫可升可降陰中陽也無毒

產陝西川谷逢秋後採根因味甘甜故名甘草忌猪

肉惡遠志反甘遂海藻及大戟芫花入太陰少陰厥

陰足經用白木乾漆苦參引使生瀉火炙溫中開去

尿管凝疼開消癰疽炊腫開除胃熱三者宜生開選

壯大橫紋刮皮生炙隨用懸癰單服即散凡毒生陰

前謂欬癰癰下大癰癰咽痛旋嘔能除同桔梗治肺

痿膿血齊來同生薑止下痢赤白雜至小兒初生加

黃連煎湯拭口有益飲饌中毒伴黑豆煮汁恣飲無

虞此中砒毒者曾人卻臍腹急疼歐臟腑邪熱堅筋骨

長肌肉健脾胃補三焦止渴除煩養血下氣解百藥

毒兇害和諸藥性杜爭後人尊之稱為國老又因性

緩能解諸急故熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒

如附子理中用者恐僭諸上調胃承氣用者恐速于下是皆緩之非謂和也小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫內加同煎此却調和相協非謂緩焉鳳髓丹中又為補劑雖緩腎濕實益元陽經云以甘補之以甘緩之以甘瀉之悉可徵矣中滿證恐甘能作脹切禁莫加下焦藥因性緩難達務宜少用凡諸嘔吐亦忌煎嘗久服輕身延年耐老

謹按五味之用苦直行而瀉辛橫行而散甘上行而發酸束而收斂鹹止而軟堅甘草味之極甘當云上發可也本草友言下氣何耶蓋甘味有升降浮沉可上可下可內可外有和有緩有補有瀉居

中之道具盡故爾

**白朮**

味苦甘辛氣溫味厚氣薄可升可降陽中陰也

無毒

**白朮**

俗呼狗產深谷雖瘦小得土氣充盈寧國池州昌化縣界田採根秋月俱同製度烘曝却異浙者大塊旋種平壤頗肥大由糞力滋溉

俗呼狗

產深谷雖瘦小得土氣充盈寧國池州昌化縣界田採根秋月俱同製度烘曝却異浙者大塊旋

曝每潤滯油多欬者薄片頓烘竟乾燥白甚凡用惟

白為勝仍覓欬者尤優咀後人乳汁潤之制其性也

潤過陳壁土和炒竊彼氣焉取向東陳年壁土研細

此因脾土受傷故竊真土氣以入心脾胃三焦四經

補此亦若非開新不必拘此製須伏防風地榆引使除濕益燥緩脾生津啟胃脘食

積痰涎消臍腹水腫脹滿止嘔逆霍亂補勞倦內傷

手足懶舉貪眠多服益善飲食怕進發熱倍用正宜  
間發瘧瘧瘧殊功補血一卒暴注瀉立効禁酒不或  
四製研散飲汗地煉或單味粥九調服加奔豚積  
忌煎因常閉氣癰疽毒禁用爲多生腫治皮毛間風  
利腰臍間血故上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣  
主氣在血主血又無汗則發有汗則止與黃耆同功  
同枳實爲消痞方助黃芩乃安胎劑哮喘誤服壅塞  
難當○又種色蒼乃名國出茅山第一擇  
潔實充良刮淨麤皮泔漬炒燥時氣一伏亦防風  
地榆便引入足經陽明太陰消癰結實去胃中窄  
狹治身面大風風眩頭痛甚捷辟山嵐瘴氣瘧疾時

氣充靈煖胃安胎寬中進食破痰癖氣壅止心腹脹  
疼因氣辛烈竄衝發汗除上焦濕其功最優若補中  
焦除濕而力甚不及于白也仍與黃蘗同煎卿散健  
行下焦濕熱神農經曰必欲長生當服山精即此是  
矣二本所忌崔蛤李桃

謹按木雖二種補脾燥濕功用皆同但白者補性  
多且有歛汗之効蒼者治性多惟專發汗之能凡  
入劑中不可代用然白木既燥本經又謂生津何  
也蓋脾惡濕脾濕既勝則氣不得施化津何由生  
故曰膀胱津液之府氣化出焉今用白木以燥脾  
濕則氣得周流而津液亦隨氣化而生矣他如茯苓

冬亦係溼之藥謂之能生津者義與此同

**生薑**

一名味苦甘氣寒無毒味厚沉也陰中

之陽無毒秋深汁降根實採收日乾者平火乾者濕

蒸乾者溫補生乾者平宜地產南北相殊藥力大小

懸隔江浙種者形雖受南方陽氣質雖光潤力微懷

慶濟南生者形雖稟北方純陰皮有疙瘩力太用

試寸水分別三名浮者天黃沉者地黃半浮沉者人

黃惟地黃濁優取服餘二者並劣檢除畏蕪蕪惡貝

母忌三白咀化鐵器腎消增切食同蘿蔔髮皓得麥

門冬善為引道拌薑汁炒不泥膈痰飲酒人服此

多痰濕帶膈如上述補頭腦虛或外行潤皮膚燥必



資酒浸方促効臻入手少陰及手太陽涼心火血熱  
俾去眼瘡瀉脾土濕熱使長肌肉骨蒸勞熱可退五  
心煩熱堪毆止血溢吐衄單方療傷折金瘡要藥又  
治婦人月經閉絕產後血上攻心妊娠下血漏胎崩  
中下血不止患人脉洪多熱加用何妨僅或脾胃有  
寒切宜斟酌酒名酒性微溫稍除寒氣入手足  
等○酒潤蒸黑名酒性微溫稍除寒氣入手足  
少厥陰經大補血氣倍滋腎水增氣力利耳目填骨  
髓益真陰傷寒後腰股最痛者殊功新產後腰腹急  
痛者立効烏髭黑髮悅色駐顏仲景製八味丸為君  
取天一所生之源專補腎中元氣天一生水故秘取

垣立四物湯作主。演癸乙同歸一治。兼療藏血之經。  
癸水屬腎乙木屬肝。為血海。故云藏血經也。久久服之。明目益壽。

按丹溪云。氣病補血。雖不中病。亦無害也。讀之。不能無疑焉。夫補血藥劑。無逾地黃當歸。若服過多。其性纏滯。每於胃氣。亦有鬱滯。等見胃虛氣弱。不能運行。血越上竅者。用此合成四物湯。以為涼血補血之劑。多服調治。反致胃膈痞悶。飲食少進。上吐下瀉。氣喘嘔血。日漸危迫。去死幾近。此皆因血藥傷其沖和胃氣。安得謂無害耶。大抵血虛固不可專補其氣。而氣虛亦不可過補其血。所貴認證的宜。量劑佐助。庶幾不失於偏損也。

**當歸**

味甘辛氣溫氣味俱輕可升可降陽也陽中微

陰無毒生秦蜀兩邦秦屬關中西有大小二種大葉者

名當歸黃白氣香肥潤此為上品市多不以此為

小葉者名當歸質黑氣薄壁枯此為下品一說

川歸力剛可攻秦歸力柔堪補凡覓拯病優劣當分

畏薑藻蒲蒙生薑海藻惡藜蘆如濕麴蘆苗去毒醇酒

製精行表洗片時行上漬一宿體肥痰盛薑汁漬宜

曝乾咬咀治血必用東垣云頭止血上行身養血中

守尾破血下流全滑血不走易老云入手少陰以心

主血也入足太陰以脾裹血也入足厥陰以肝藏血

導引劑在人參黃耆皆能補血在牽牛大黃皆能

破血從桂附茱萸則熱從芒硝入黃則寒別說又云  
能使氣血各有所歸故因名曰當歸逐跌打血凝併  
熱痢刮疼滯住腸胃內主欬逆氣上及溫瘧寒熱洗  
在皮膚中女人胎產諸虛男子勞傷不足眼疾齒疾  
痛難忍癰瘡金瘡肌不生中風癱瘓中惡昏亂崩帶  
湛漏燥澁焦枯並急用之不可缺也又同川芎上治  
頭痛以其諸頭痛皆屬肝木故亦血藥主之甚滑大  
便瀉者須忌

謨按正傳云當歸能逐瘀血生新血使血脉通暢  
與氣並行周流不息因以為號然而中半已上氣  
脉上行天氣主之中半已下氣脉下行地氣主之

身則獨守乎中而不可行也。人身之法象乎是焉。故瘀血在上焦與上焦之血少則用上載之頭疼。血在下焦與下焦之血少則用下載之尾若欲行中焦瘀血與補中焦血虛則用中載之身。雖獨當歸為然他如黃芩防風桔梗柴胡亦皆然也。觀此一說較前東垣雖殊思亦近理不妄乎附篇末憑人所宗。

又按經云主欬逆上氣議者以當歸血藥如何治胃中氣也殊不知當歸非獨主血味蕪辛散乃為血中氣藥况欬逆上氣非止一端亦有陰虛陽無所附以致然者今用血藥補陰與陽齊等則血和

而氣降矣。本經所謂義或由斯。

**牛膝**

味苦酸。氣平。無毒。忌牛肉。畏白朮。所惡之藥有

三。螢火。陸英。龜甲。地產尚懷慶。雖種類有雌雄。雌雄

**膝節**細莖青。根短堅脆無力。雖經節大莖紫。根長

柔潤有功。秋後採根。曝乾待用。去飽。黑黯。選肥壯

鮮明。因與牛膝同形。人故假此為真。凡人藥劑。酒漬

吹咀。善理一身虛羸。能助十二經脈。主手足寒濕。痿

痺。大筋拘攣。理膀胱氣化。遲難小便。疰必補中續絕

益陰壯陽。填髓除腰膝痠疼。滑血滋鬚髮烏黑。竹木

刺入肉。嚼爛厚罨。老瘡久弗痊。單煎連服。卒得不識

惡毒。搗生根敷上。即差。尿管澀痛。幾危。煮酒飲下。

立愈治女人血癥丘瘕月水行遲療產婦血暈血虛  
兒枕痛甚同麝香墮胎甚捷土牛膝一兩麝一錢搗  
細末酒下即墮引諸藥下走如奔故凡病在腰腿胫踝之間必

**黃精**

味甘氣平無毒山谷土肥俱出茅山嵩山獨良

莖類桃枝脆柔一枝單長葉如竹葉畧短兩葉對生

一說其葉偏生不相對者為偏精葉相對者為正精功用尤勝又華佗漆葉青黏散云青黏即黃精

之正葉者花開似赤豆花實結若白黍米結實者不並

未審的否花開似赤豆花實結若白黍米堪服餌抱朴子云服花勝實勝實勝根但花難得生

一瓣勿厭採收冬月挖根嫩薑彷彿仙家稱名黃精俗

多呼為野生薑也洗淨九蒸九曝代糧可過凶年

味甘。甜。又名米舖。入藥。療病。生者亦宜。鉤吻畧同。切勿誤用。安五臟六腑。補五勞七傷。除風濕。壯元陽。健脾胃。潤心肺。旋服年久。方獲奇功。耐老不饑。輕身延壽。小兒羸瘦。多啖彌佳。

謨按博物誌曰。太陽之草名黃精。餌之可以長生。太陰之草名鉤吻。食之入口立死。夫鉤吻野葛之別名也。人但信鉤吻殺人。並無敢食之者。何嘗信黃精延壽而餌之不厭者耶。本經註中載古一婢逃入深山。得黃精。餌之日。間不饑。久漸輕身。飛越山頂。莫有能追之者。此亦非虛誣也。

**遠志**

味甘。氣溫。無毒。莖類麻黃。而青。兗州鄒泰山屬。



刺俱有。本名遠志。四月採。用宜去骨取皮。甘草湯

漬一宿。因苦下行以其漉。向日曝乾。入劑煎。畏真珠

藜蘆。蟪蠶。宜冬葵。茯苓。龍骨。雄附。雄黃大毒。亦能殺

除。益精壯陽。強志。倍力。辟邪氣。去邪夢。定心氣。安心

神。增益智慧。不忘。和悅顏色。耐老。仍利九竅。亦補中

傷。欬逆。能。驚悸可止。治小兒驚癇。客忤。療婦人血

噤失音。○**石草**。苗葉之名。古方曾用。獲効。除胃痺。心

痛。氣逆。經方治此禁虛損。夢魘精遺。

**石草**。味辛苦。氣溫。無毒。池郡屬南最多。各處亦有。

生石澗中。為美。一寸九節。方靈。揀去露根。土者堪

法。勿犯鐵器。藥入搗碎。使宜。秦艽。惡地膽。林黃。忌鉛

豬羊肉主手足濕痺。可使屈伸。貼發背癰疽。能消腫毒。下氣除煩悶。殺蟲愈疥瘡。消目翳。去頭風。開心洞達。出音聲。益智慧。通竅。虛靈。却耳聾。耳鳴。禁尿遺尿。數腹痛。或走者。易効。胎動欲產者。即安。鬼擊。情死。難甦。急灌生汁。溫瘧積熱。不解。宜浴。濃湯。單味入酒煎。療血海敗。併產後下血不止。細末鋪薦卧。治遍身毒。及不瘥。發痛瘡瘍。多服。聰明不忘。久服延年耐老。

謨按生石澗而葉細嫩者名菖蒲。根小節稠味甚辛烈。堪收入藥。通竅開心。種池塘而葉麓長者名菖陽。根大節疎。味蕪和淡。惟取作餞饗酒點茶。故古方中但用此字。特加石字于上。示其所變使人

之不悞取也。匪特菖蒲為然。他如梔子、茨菇、每加山字。亦此意。爾藥必求真。服纔獲効。本經註下。載原有服石菖蒲一十三年。身生長毛。冬袒不冷。日誦萬語。年記常全。今讀書士。亦或取和遠志為丸。朝夕吞服。蓋因目擊其說。欲假以開聰明。益智之一助也。

**天門冬**

味苦甘。氣平。大寒。氣薄。味厚。沉也。陰也。陽中之陰。無毒。山谷俱有。夏秋採根。蒸爛。去皮去心。曝乾。旋咀。旋用。點點不明生微垢也。畏曾青。忌鯉魚。儻誤食中。毒。取浮萍解之。使宜貝母、地黃。經入手。肺足。腎療風。淫濕痺。補虛損。勞傷。殺三蟲。去伏屍。且強骨髓。潤。

五臟悅顏色充養肌膚解渴除煩消痰住嗽保肺氣  
不被熱擾通腎氣能除熱淋止血溢妄行潤糞燥閉  
結同參耆煎服定虛喘促神方和薑蜜熬膏天門冬  
自然汁  
三碗蜜  
半碗共和破頑痰癖劫劑單用研末調酒久  
久益氣延年肺痿肺癰亦堪調治蓋因苦泄滯血甘  
助元氣寒去肺熱此三者天門冬之功焉虛熱人加  
用正宜虛寒者切禁莫服因專泄不能專收故爾

**麥門冬**

味甘微苦氣平微寒降也陽中微陰無毒潤

畝平堤土肥則產葉類莎草長秀根如麥顆連珠故  
因名麥門冬也畏苦參青蘘木耳惡苦芩苦瓠欬冬  
去心用不令人煩澤肥大方獲効速地黃車前為使

入手太陰少陰治肺火邪及肺痿膿吐腥臭補心  
勞傷損併心血錯經妄行益精強陰毆煩解渴心腹  
結氣能散腸胃傷飽可消美顏色悅肌膚止嘔吐愈  
痿蹇音去心下支滿退虛熱客邪經枯乳汁不行堪  
資作引肺燥效聲連發須仗為君加五味人參三者  
同煎名生脉散子專補元氣與地黃阿膠麻仁共用  
能潤經益血復脉通心按本經多治脾胃臟腑後用  
者專療心肺兩經久服輕身不饑不老

謨按天麥門冬並入手太陰經而能毆煩解渴止  
欬消痰功用似同實亦有偏勝也麥門冬兼行手  
少陰心經每清心降火使肺不犯於賊邪故止欬

上效天門冬復走足少陰腎。屢屢滋腎助元。令肺  
得全其母氣。故消痰殊功。蓋痰係津液凝成。腎司  
津液者也。燥盛則疑。潤多則化。天門冬潤劑。且復  
走腎經。津液縱凝。亦能化解。麥門冬雖藥劑。滋潤  
則一。奈經絡兼行相殊。故上而止咳。不勝於麥門  
冬。下而消痰。必讓於天門冬。爾先哲亦曰。痰之標  
在脾。痰之本在腎。又曰。半夏惟能治痰之標。不能  
治痰之本。以是觀之。則天門冬惟能治痰之本。不  
能治痰之標。匪但與麥門冬殊。亦與半夏異也。

**五味**

味酸。氣溫。氣輕。味厚。降也。陽中微陰。無毒。江  
北最多。江南亦有。春生。苗莖赤色。漸蔓。高木引長葉。

發似杏葉尖圓花開老蓮花黃白秋初結實叢綴莖  
端粒圓紫不異櫻珠核偏紅儼若猪腎採收日曝膏  
潤難乾南北各有所長藏留切勿相混風寒咳嗽  
**附錄**為奇虛損勞傷**附錄**最妙惡菱莖勝烏頭以  
茯苓為使入肺腎二經收斂耗散之金滋助不足之  
水生津止渴益氣強陰敗煩熱補元陽解酒毒壯筋  
骨霍亂瀉痢可止水腫腹脹能消冬月咳嗽肺寒加  
乾薑煎湯治効夏季神力困乏同參者參藥散參黃  
冬黃服良其熱嗽火氣盛者不可驟用寒涼之藥必  
資此酸味而斂束然不宜多用若多用則恐致虛熱  
以為缺蓋因皮甘肉酸核中辛苦俱兼鹹味故名曰

五味子本經只云酸者木為五行先也宜預搗碎與方後投煎

**菟絲子**

味辛甘氣平無毒朝鮮國多產菟句瀋州東

獨佳蔓延草木之間無根假氣而出實如蠶子秋採陰乾色黃細者名赤細色淺大者名菟藟種類雖二功效並同先用水洗去砂次以酒漬杵爛捏成薄餅向日曝乾研末為丸不堪煎液益氣強力補髓添精虛寒膝冷腰疼正宜多服鬼交夢遺精泄勿厭煩吞肥健肌膚堅強筋骨服之久久明目延年國語煎湯小兒可浴解執毒癩瘰散癰塌痘瘡

**五石脂**

色分六品味應五行氣稟俱平服餌無毒○



**如翠羽**一名應木味酸產泰山專補肝氣興仁

恕強志明眼目安魂○**珊瑚**一名應火味苦

產衡山善養心神增智慧不忘開胃隔除結○

截肪可比玉一名味辛應金華山生益肺定魄止欬逆

潤皮毛○**澤漆**堪偷一名味鹹應水常山出益

腎破癰利二便通九竅○**黃金**一名嵩嶽

山多一名與紫衣同一名高夏山有並味甘應土咸

逐邪益脾堅骨健筋悅顏駐色六芝俱主祥瑞夜視

光彩映人燒不焦藏不朽久服延壽常帶辟兵世所

難求醫絕不用但附其說俾識其詳

**朱草**微苦氣平寒屬土與金有水火可升可

降陰中陽也無毒種類顏色多品應候黃小為良  
云菊有黃花是山野間味苦莖青名苦蕒勿用花  
黃色但氣味苦入藥反損藥家園內味甘莖紫謂甘菊堪收苦者  
胃氣反傷甘者陰血兼補為使一味宜桑白皮豉頭  
風止頭痛暈眩清頭腦第一養眼血收眼淚腎膜明  
眼目無雙變老人皓白成烏同地黃釀酒解醉漢昏  
迷易醒共菊花煎湯散濕痺去皮膚死肌安腸胃除  
胃癰煩熱利一身血氣逐四肢遊風腰痛陶陶亦堪  
主治久服弗已輕身延年搗**根**取汁頓嘗夏秋採  
根救疔腫垂死即活

謹按月令于桃李桐但言花而不言色獨于菊曰

黃花取其得時之正。況當其候。田野山側盛開。滿  
眼皆黃花也。月令所取。不無意焉。入藥用黃蓋本  
諸此。又考根苗花葉。亦可共劑成方。三月上寅日  
採苗。六月上寅日採葉。九月上寅日採花。十二月  
上寅日採根。並陰乾百日。各等分稱勻。擇成日製  
之。搗千杵為末。用蜜煉熟。豆大丸。成酒服七丸。一  
日三服。百日身輕潤澤。一年髮白變烏。二年齒落  
更生。三年貌如童子。至賤之草而有至大之功。特  
附其詳。以為老者益壽之一助爾。

**意以仁**

味甘。氣微寒。無毒。近道俱出。真定。

即名屬者

良。多生曠野澤中。莖高三四尺。許。葉類薔薇。花開後

黃結實而名薏珠。小兒每穿為感。醫家採用春穀取  
仁。或和諸藥煎湯。入熟微。或搗粳米煮粥。薏仁粒  
同煮。熟後方調。專療濕痺。且治肺癰。筋急拘攣。屈伸  
不便者。最効。此濕熱。欬涕。唾膿。血併出者。極佳。此肺  
除筋骨邪入作疼。消皮膚水溢。發腫。利腸胃。去渴消  
久服。益氣輕身。多服。開胃進食。但此藥力和緩。凡用  
之時。須當倍於他藥。爾若挖根煮汁。可攻烟墮胎。肺  
癰服之。亦臻神効。

謨按衍義云。本經謂主筋急拘攣。須分兩等。大筋  
縮短拘急不伸。此是因熱拘攣。故此可用。倘若因  
寒筋急不可用也。又云。受濕者。亦令筋緩耳。按丹

溪曰寒則筋急熱則筋縮急因于堅強縮因于短促若受濕則弛弛因於寬長然寒與濕未嘗不挾熱而三者又未始不因於濕薏苡仁去濕要藥也二家之說實有不同以衍義言觀之則筋病因熱可用因寒不可用以丹溪言觀之則筋病因寒因熱因濕皆可用也蓋寒而留久亦變為熱况外寒濕與熱皆由內濕啓之方能成病內濕病酒癰為之若甘滑陳久燒炙辛香謂之曰三者未始不因於濕是誠首者日月聾者雷霆歟

**蜀道**

即山藥味甘氣溫平無毒南北州郡俱產惟懷

慶者獨良秋採曝乾灰藏不蛀此灰同藏性惡其

遂共齊不宜使天麥門冬紫芝入手足太陰兩臟治  
諸虛百損療五勞七傷益氣力潤澤皮膚長肌肉堅  
強筋骨除寒熱邪氣煩熱蕪除卻頭面遊風風眩總  
卻羸瘦堪補腫硬能消開心孔聰明澁精管洩滑理  
脾傷止瀉參苓白朮散頻加逐腰痛強陰六味地黃  
丸常用搗篩為粉作糊其粘久服不饑延年耐老  
謨按山藥能消腫硬因能益氣補中故爾經曰虛  
之所在邪必湊之着而不去其病為實非腫硬之  
謂乎故補其氣則邪滯自不容不行丹溪云補陽  
氣生者能消腫硬正謂此也

**石斛**

味甘氣平無毒多產六安劔銘鑛亦生兩廣

礦莖下有節色黃類金世人每以金釵石斛為云蓋亦取其象也其種有二細認畧殊生溪石上者名石折之似有肉中實生櫟木上者名木折之如麥稈中虛石斛有効難尋木斛無効易得賣家多採易者代克不可不預防爾惡疑水石巴豆畏白殭蠶雷丸以酒浸蒸方宜入劑卻驚定志益精強陰壯筋骨補虛羸健脚膝歐冷痺皮外邪熱堪逐胃中虛火能除厚腸胃輕身長肌肉下氣

**附註**

味苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也陰中微陽

無毒多生徐解二州

並屬南

形類菖蒲柔軟肥白有

力姑無功去淨皮毛忌犯鐵器引經上頸酒炒變

升益腎滋陰。塩炒便入。乃足少陰本藥。而又入足陽  
明。入手太陰也。補腎水。瀉去無根火邪。消浮腫。為利  
小便佐使。初痢臍下痛者。能卻久瘡。煩熱甚者。堪除。  
治有汗骨蒸。熱癆。療往來傳屍。症病。潤燥解渴。虛熱人  
倍用之止欬消痰。久服不宜。令人作瀉。仍治溪毒。河  
澗澡洗。先以藥末投水上流。自無患矣。

謨按東垣云。仲景用此為白虎湯。治不得眠者。煩  
燥也。蓋煩者肺燥。燥者腎以石膏為君。佐以知母之  
苦寒。以清腎之燥。緩以甘草粳米之甘。使不速下  
也。經云。胸中有寒者。瓜蒂散表熱裏寒者。白虎湯。  
瓜蒂知母。味皆苦寒。何謂治胃中寒也。曰。讀者當



逆幾之如言亂臣小人亂當作治仲景言寒其効言之熱在其中矣若果為寒安得復用苦寒之劑且白虎湯證脉尺寸俱長其熱明矣豈可因其辭而害其意乎

**肉蓯蓉**

味甘酸鹹氣微溫無毒陝西州郡俱有馬

落地所生端午採乾用先酒浸刷去身外浮甲劈除心內膜筋或酥炙酒蒸仍碎拍入劑忌經鐵器切勿犯之治男子絕陽不興洩精尿血遺瀝療女人絕陰不產血崩帶下陰疼助相火補益勞傷暖腰膝堅強筋骨丹溪云雖能峻補精血驟用反動大便○又種

**續陽**

亦產味甘可啖以酥塗炙代用亦宜煮粥彌佳

入藥尤効。潤大便燥結。諸虛弱之者補陰血虛羸與陽

固精強陰益髓。但本經原缺未載。此丹溪續補為云。

○仍舊經巖石多產根類。初生蓮藕。本經一名列

當溫補畧同。功力殊劣。或壓匾假克。前藥肉苁蓉等

多以此壓匾假克又以金蓮草根鹽潤克賣誤服之反有損也凡用者務審精詳。

**補腎**即破味苦辛。氣大溫。無毒。生廣西諸州。子圓匾

而綠。鹽酒浸宿。鮮酒去之者蒸過曝乾。又同炒拌烏油

麻炒熟。去麻單用。亦為丸。搗胡桃肉。再加杜仲青鹽

嫩青治男子勞傷。療婦人血氣。腰膝痠疼。神効骨髓

傷敗。殊功。除囊濕而縮小便。固精滑以興陽道。卻諸

風濕痺。去四肢冷疼。惡其草須知。忌芸薹羊乳。

羌活

味苦甘辛氣平微溫氣味俱輕升也陽也無毒

多生川蜀亦生隴西得風不搖無風自動因又名獨搖草也本與獨滑同種後人分有二名紫色節密者為羌黃色成塊者為獨今醫家用羌滑多用鞭節用獨滑多用鬼眼羌滑則氣雄獨滑則香細氣雄者入足太陽香細者入足少陰是知羌滑本手足太陽表裏引經之藥而又入足少陰厥陰二經名列君部之中非比柔懦之主此誠撥亂反正大有作為者也故小無不入大無不通能散肌表八風之邪善利周身百節之痛排巨陽肉腐之疽除新舊風濕之證須去黑皮膚爛煎服方有神功如若加入川芎立止本經

一頭痛○獨滑主治較羌稍殊乃足少陰表裏引經專治痛風與少陰經伏風而不治太陽經也故兩足濕痺不能動履非此莫痊風毒齒痛頭眩目暈有此堪治雖伏治風又資燥濕經云風能勝濕故也但今賣者多採土當歸假充不可不細辨爾

謾按會編云羌滑獨滑本經既云同種再無別條則非二物可知矣後人因見形色氣味畧殊故立異論不思物之不齊物之情也是以羌滑獨滑雖係一種而一種之中亦有不同有緊實者有輕虛者仲景用獨滑治少陰必緊實者東垣用羌滑治

者正如黃芩取枯熟者名宿上用治

天陰取厚者名之太用治陽明義也。方但用獨滑今方既用獨滑又用菴滑不知病宜兩用耶抑不知未之考耶。

第四卷桑根白皮款後謹按宜參看

附錄

味苦氣平微寒氣味俱輕升也陽也陰中之陽

無毒州土各處俱生銀夏州屬出者獨勝根鬚長如鼠尾一二尺餘香氣直上雲端有鶴翔集八月採折淨蘆頭瘰癧病上升用根酒漬中行下降用梢宜生畏女苑藜蘆使半夏一味乃手足少陽厥陰四經行經藥也瀉肝火去心下痰結熱煩用黃連諸蠟為佐治瘡瘍散諸經血凝氣聚與連翹同功止偏頭疼

胸脇刺疼。及膽痺疼痛。解肌表熱。早晨潮熱。併寒熱。往來傷寒。門實為要劑。溫瘧證。誠作主方。且甦濕痺。拘攣。可作濃湯浴洗。在臍主血。在經主氣。亦婦人胎前產後血熱必用之藥也。經脉不調。加四物。秦艽。牡丹皮。治之最効。產後積血。佐巴豆。三棱。蓬莪。攻之即安。又引清氣順陽道而上行。更引胃氣。司春令以首達。亦堪久服。明目輕身。○葉名辛香可食。

謨按衍義云。本經並無一字治勞。今人治勞方中。鮮有不用誤。世甚多。嘗原勞怯。雖有一種真臟虛。真復受邪熱。熱因虛致。故曰勞者。牢也。亦須斟酌。加熱去。當急也。設若無熱。得此命。經驗。

古治勞熱者。蓋煎丸少佐柴胡正合宜。爾古服之無不効者。曰。華子竟信為實。就註本經條下。謂補五勞七傷。除煩而益氣力。藥性論又謂治勞乏羸瘦。是皆不智。妄自作俑者也。若此等病。苟無實熱。醫者執而用之。不死何待。本草註釋豈可半字。鹵莽耶。萬世之後。所誤無窮。誰之咎也。明達之醫。固知去取中下之士。寧不蹈其轍哉。非比仲景治傷寒寒熱往來如瘧之證。製大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒硝等湯。此誠切要之藥。萬世之所宗仰。而無鱗議者也。

**小柴胡**

味苦甘。氣平微寒。氣味俱薄。浮而升。陽也。無毒。

雖多陝地惟尚益州改屬成都府入藥宜根逢秋採

曝乾形輕實者第一削出青綠色者亦佳擇雞骨相

同去黑皮腐爛乃足陽明太陰行經之藥凡補脾胃

必此引之若得白芷葱白同煎又走手經陽明太陰

非此四經不可用也解百毒殺百精殃鬼釋諸瘴辟

諸疫瘟邪去傷風於皮膚散發熱於肌肉儻太陽證

具誤服是先引賊寇破家東垣云初病太陽証便服

惟遺經反引太陽邪氣入于陽務認分明切勿鹵莽

止頭痛喉痛齒痛併中惡腹痛理口瘡疥瘡斑瘡及

疏宣爛瘡治風腫風癰療肺癰肺痿故聖藥為瘡家

之虎的藥來風家之補并提元陽不下陷陰下挾引



諸藥同行達四經東垣云引葱白散手陽明風邪引石膏止足陽明齒痛是也國醫取堪治脾瘕久服不夭輕身益壽

謹按仲景傷寒論云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯主之夫犀角乃陽明聖藥也又曰如無犀角代以升麻其犀角升麻氣味大相遠隔何以代云不過知升麻亦陽明經藥用之以引地黃及諸藥同入陽明經爾舍此他用豈復能乎

**車前子**

味甘鹹氣寒無毒山野道途處處生長一名

牛舌草又謂蝦蟇衣葉中起苗苗上結子細類葶藶採擇端陽專入膀胱無療肝臟通尿管淋瀝澀痛不

走精氣為奇。岐風熱衝目赤疼。旋去翳膜。誠妙。濕痺  
堪卻。生產能催。益精強陰。令人有子。故今種子方內。  
所製五子衍宗丸。枸杞菟絲五味覆盆斯亦列其名  
者。蓋由得此說也。**覆盆子**搗生汁飲之。治一切衄痢尿  
血。亦利水道。堪逐氣瘕。久服輕身延年耐老。

**地膚子**

一名落  
帚子

味苦氣寒無毒。生于平澤中。苗名鐵掃

帚。葉如荊芥子。類蠶沙。秋末採收。陰乾入藥。專利水  
道。去熱膀胱。多服益精強陰。久服明目聰耳。浴身卻  
皮膚瘙癢。熱疹洗眼。除熱暗雀盲。澁疾。**桑**搗絞汁服  
之。又散諸惡瘡毒。泄瀉分滲。血痢兼毆。

**桑葉**

味甘

氣平微寒無毒。川澤多生。莖高四

芥菜類苜蓿太堪作菜蔬子如菘豆銳圓可入藥  
劑冬月採曝搗碎纔煎惡火麻使著實除肝熱尤和  
肝氣收目淚且止目疼誠為明目僊丹故得決明美  
譽仍止鼻衄水調末急貼腦心更益壽齡蜜為丸空  
心吞服治頭風須築枕臥消腫毒亦調水敷頭痛兼  
毆蛇毒可解

第二卷青箱子款後護按宜參看

**灰藜**

味苦辛氣溫微寒無毒多生同州沙苑陂河

亦產近地道傍牧馬草場布地蔓出詩云塙有茨者  
是焉使宜烏頭種分黑白黑成顆粒較馬蕒子畧殊  
此種多白多刺芒比鐵藜藜無異此種亦黑僅合丸

散生取研成白堪用煎湯刺須炒去。微婦人微結積聚止。男子遺溺泄精。催生落胎。止煩下氣。乳發帶下。易刻。肺痿膿吐。可瘳。瘳雙目赤疼。醫生不已。治遍身白癩。癢難當。除喉痺。頭瘡。消痔。癰陰汗。久服堪斷穀食。輕身明目。長生。藥煮浴湯。亦去風癢。

**藍實**

味苦甘。氣寒無毒。閩嶺閩係福建甚多。近道亦

有所產。須分數種。

木藍馬藍花藍吳藍俱不入藥

惟用蓼藍認

狀的真。與蓼無異。人家園圃亦多種栽。秋採實曝乾。

微研碎煎服。殺蠱蛟疰鬼惡毒。敗五臟六腑熱煩益

心力。填骨髓補虛聰耳目。利關節通竅。久服勿厭黑

髮輕身。藥可作靛染青。生搗堪絞汁。須飲散熱風。

赤腹愈疔毒金瘡和麝香點諸蟲咬傷卑飲下追蠶  
瘰癧痛中百藥毒總解生諸惡瘡並歐衍義云藍屬  
水有木能使散敗之血分諸經絡故解諸毒而得効  
之速焉又治小兒壯熱成疳更療婦人產後血暈消  
赤眼暴發止吐衄時來天行瘟疫熱狂並宜急取煎  
服丹溪普濟消毒飲中加板藍根者即此是也○造  
成**靛花**亦入醫方火瘰火丹塗之即退○又染髮上  
浮沫即靛花雖名**靛花**非直直者出波斯國問真青與  
靛花不路遠罕有此却因功效相類本經註云靛花  
同類特假為名旋収曝乾色甚紫碧市家多取乾靛花  
賣殊不知靛枯黑重實花嬌嫩輕浮不可不細擇爾

以水飛淨灰脚合丸製散隨宜治小兒發熱驚癇調  
小兒疳蝕消瘦瀉肝止暴注下毒殺惡蟲收五臟養  
火有功消上膈痰火最効時疫頭痛飲傷寒赤斑  
水調服之應如桴鼓○染成○瘡○堪剪燒灰外科方  
中亦每早用敷惡瘡經年不愈貼灸瘡出血難差  
謨按該花雖非青黛然治小兒疳蝕消瘦發熱屢  
有奇功古傳歌括一章附後令人便覽歌曰小兒  
疳病變成疳不問強羸女與男腹內時時如下痢  
青黃赤白一般般眼黃面黃鼻孔赤殺道開張不  
欲看煩熱毛焦兼口渴皮膚枯槁四肢癱唇焦嘔  
逆不乳嘔壯熱增寒臥不安此方便是青黛散取

效猶如服聖丹

**天麻**

味辛苦氣平無毒春初始生苗葉彷彿芍藥成

叢中起梗二三尺高因名赤箭下發根王瓜般大此

謂天麻鄆利二州並屬山東山谷俱有秋月採取乘潤刮

皮畧煮沸湯曝乾入藥治小兒風疰驚悸瘡大人風

熱頭眩肢厥濕痺拘攣主癰瘕寒滯通血脉開竅利腰

膝強筋諸毒癰疽並堪調愈○再考赤箭原號定風

益氣力強陰下支滿除疝殺鬼精蠶毒消惡氣腫癰

久服增年輕身肥健

謹按別說云天麻言根用之有自內達外之理亦

箭言苗用之有自表入裏之功蓋根則抽苗徑直

而上豈非自內達外乎。苗則結子。成熟而落。反從  
榦中而下。至土而生。又非自表入裏乎。以此而觀  
竈可識其內外主治之理也。

**蘭**

味辛甘。氣平寒。無毒。即春秋開花蘭香葉也。幽  
谷深林。隨處俱有。葉長不庠。花小甚香。凡入藥中。採  
葉煎服。利水道。創痍。辟益氣。生津。殺蟲毒。辟不祥。潤  
膚逐痺。臍痺必用。消渴須求。東垣有云。能散積久陳  
鬱之氣。內經亦曰。治之以蘭。除陳氣也。久服不老。輕  
身通神。

謨按蘭草生於深林。似真獨也。故稱幽蘭。其葉長  
青。其莖深紫。與蕙相類。逢春出芽。一莖一花而香。



有餘者名蘭一幹五六花而香不足者名蕙花同  
春開但蘭先而蕙繼之然江南之蘭只春芳郁荆  
楚閩廣秋復再芳故有春蘭秋蘭不同爾丹溪云  
幽蘭葉凜金水清氣而似有火人知花香之貴不  
知葉用有方如東垣之所云也况藥味載諸內經  
甚少而蘭獨擅名非深有功力其能致乎

**補遺**

味甘氣平無毒種盛泰州

屬有根滿池澤經秋

盡瘁逢春復生初萌孽紅白茸茸為補遺曾載周禮

漸成柄其脆可噉號補遺亦著說書春深發葉成叢

夏半抽梗中起花抱梗杪名補遺類武士捧槌屑綴

此中即補遺以蓋者金粉市廛收為樛青調蠶和

醫家採入藥煎，篩淨曝乾。血病必用補血止血，須炒破血消腫，宜生止血熱，妄行吐血，衄唾咯立効。消瘀血，凝積癥瘕，崩帶殊功。調女人月候不勻，去產婦兒枕作痛，癱跌撲折損，理風腫癰瘡，久服如常。奇功旋奏，輕身兼益氣力，延年可作神仙。但不益極虛之人。若多食未免自利，節後赤澤，赤澤去細黃其色，**當知**。赤澤止瀉瀉腸，亦宜炒使，齒採作薦，乃名**香通**，除臭爛口中，鼓邪氣，心下聰耳明目，耐老堅牙。

**卷八**

味辛苦，氣溫平，微寒，無毒，多生石厓濕處，形僅

寸半而長，莖葉紫黃，彷彿匾栢，遇雨舒開如掌。經晴卷束如拳，凡欲用之，隨時收採，止血用炙去血，宜生

治婦人癥瘕血閉殊功療男子風眩痿痺立効止脫  
肛而散淋結除啼泣以敵鬼邪鬼疰鬼胎鬼腹百邪  
益精強陰鎮心安魄煖水臟育孕和顏色輕身

**何首烏**

味甘苦澁氣微溫無毒今生近道原出祐城

將名屬

籬墻垣隨處蔓發有雌雄二種對長苗成

藤夜交合相聯晝分開各植凡資入藥秋後採根大  
類山甜瓜外有五稜瓣雌者淡白雄者淺紅雌雄相  
兼功驗方獲咀竹刀禁傷鐵器浸泔水過宿曝乾木  
杵搗春茯苓引使忌猪羊血汁惡蘿蔔菜蔬王璠瘰  
癧疽瘰癧頭面風疹長筋骨悅顏色益血氣止心疼久  
服添精令人有子婦人帶下為末酒調原取名曰夜

交藤後因順州南河縣何翁服之白髮變黑故改稱  
爲何首烏也爾雅九蒸九曝又服亦駐顏容

謨按李遠曰此僊草也五十年者如拳太服一年  
則鬚髮黑百年者如椀太服一年則顏色悅百五  
十年者如盆太服一年則齒更生二百年者如斗  
栲栳太服一年則貌如童子走及奔馬三百年者  
如三斗栲栳大其中有鳥獸山嶽形狀號山精純  
陽之體久服則成地僊也李君斯言必有所考不  
然豈妄誕以欺人哉况今臺閣名公競相採取異  
法精製爲丸日吞亦因獲効異常曾令錄梓傳世  
或食曰八僊丹或曰延壽丹或曰八珍至寶丹徵

實取名一以重藥之非凡二亦表李君之不誣衆

**益母草**

一荒貉味辛甘氣微溫無毒方梗凹黯面對節生

枝葉如火麻花開紫色

此草有二種關川澤隨處俱

有端午連根拔收風際陰乾忌犯鐵器單用最効方

載女科或研羅細末煉蜜爲丸或搗煎濃湯熬成膏

汁總調胎產諸證故加益母之名去死胎安生胎行

瘀血生新血治小兒疳痢敷疔腫乳癰汁滴耳中又

主聾耳細剉醋炒馬嘴堪敷且制硫黃尤解蛇毒多

服消腫下水久服益精輕身味相同亦理胎產苦

除目瞽易去心煩

謹按丹溪云荒蔚子活血行氣有補陰之功故名

益母凡胎前產後有所恃者血氣也胎前無滯產後無虛以其行中有補也

**續斷**

味苦辛氣微溫無毒陝蜀最盛三月纔生似苧

麻葉苗幹四稜類大薊根皮色黃赤實之入藥取根於秋多有麤良務擇精細但認狀如鷄脚者爲上節節斷皮黃皺者方真去白裏硬筋以醇酒浸宿烈日曝過薄片咀成惡雷丸使熟芋續筋骨調血脉專療跌撲折損消腫毒生肌肉善理金瘡碰傷乳癰瘰癧殊功腸風痔瘻立効縮小便頻數固精滑夢遺亦煖子宮俾育妊孕久服勿厭氣力倍常

**漏蘆**

味苦鹹氣寒無毒一名野蘭莖若筋大葉似白

蒿有莢花綻芽端色黃子結類油藤作房根生如蔓

青細黑單州

西山

出者爲勝八月採根陰乾製度如

儀遠錯弗効咀成薄片相對甘草而蒸從巳至申檢

淨甘草纔用

出霜

公連翹爲使行足陽明治身體風

熱惡瘡去皮肌癢痒癰瘡主乳癰發背理痔瘻腸風

補血排膿生肌長肉引經脉下乳汁續筋骨療折傷

止遺溺泄精除風眼濕痺匪專煎飲亦作浴湯久服

益氣輕身耳目聰明不老

**忍冬**

味甘氣溫無毒多生田坂畛畹或產園圍墻垣

凌冬不凋名由此得蔓延樹上藤多左纏故文名左

纏藤莖梗方小微紫葉如薜荔而青四月開花香甚

撲鼻初開色白經久變黃因又名金釵股又名老翁鬚凡數名者前乃美其藤之異常此則美其花之出類也根莖花葉隨時採收春夏採花葉專治癰疽誠為要藥未成則散甚多拔毒之功已成則潰大有回生之力或搗汁攪酒頓飲或研爛拌酒厚敷或和別藥煎湯隨證輕重取効別說又云大治五種飛屍倘被鬼擊作痛亦可服也血痢水痢兼治風氣濕氣咸除老人久服之輕身長年益壽

按此草甚多處處生產患人生癰發毒固未肯遺老人益壽延年何嘗採服且人莫不欲壽也至



易得者尚不肯為反更求遠方難得之藥是貴遠賤近庸人之情習俗之常也

**蜀獨優**

味辛甘氣微溫無毒江淮雖有巴蜀獨優多

生深谷茂林葉厚凌冬不瘁故俗名三蔓草又名不  
凋草也凡入藥劑採根陰乾宿根色青嫩根色白用  
之功力相若但選肉厚連珠根原有心乾縮自落人  
或抽摘中亦空虛非自有小孔耳末去盡者即今方  
家惟以中間紫色者為良據蜀人云都無或係染成或用黑豆  
煮汁沃之亦或同紫雖做成氣味殊失或又採山律  
根染紫假充蜀中一種山律根形亦相類但色白俱  
不可不細察也擊破視之乃紫多採充實莫能辨認小  
者中雖紫又有微口如粉色理小

暗製須酒浸過宿曝乾惡丹參雷力宜覆盆爲使禁  
夢遺精滑補虛損勞傷治頭面遊風及大風浸淫血  
癩主陰痿不起併小腹牽引絞疼安五臟健骨強筋  
定心氣利水消腫益精增志惟利男人

**青蒿**

味苦酸氣平無毒種生蔡州山谷今河南苗類

青蒿作叢多者三五十莖高者六七尺許莖莖條直  
自異群蒿花類菊花淡黃亦同秋綻實若楮實深赤  
但不味甜九月採收曝乾待用明目增智慧益氣充  
肌膚腹不饑輕身耐老

**集**

按劉向說苑云天下和平聖君在位其種長丈

一根百莖下必守以靈龜上常罩有雲霧蒲山無

毒螫一方純虎狼莖採類鳳尾龍頭下噬通天根  
月窟誠爲神物世所罕稀今所生者不過出蔡州  
尋常而已安能得絕妙之如是耶

**五葉藤**

味辛苦氣溫微寒無毒山澤多生隨處俱有

藤蔓類木高並人肩五葉作叢爲良三葉四葉畧次  
凡仗入藥採根取皮畏蛇蛻人參宜遠志爲使堪用  
釀酒任研爲丸遂多年瘀血在皮筋中酌常痛風痺  
纏腳膝裏堅筋骨健步強志意益精去女人陰癢難  
當扶男子陽痿不舉小便遺瀝可止陰蝕疽瘡能除  
輕身延年長生不老真仙經藥也採作蔬食散風  
瘡於一身煎酒嘗治風痺於四肢

謨按五加之名據義甚大蓋天有五車之星精也  
青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之  
津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方  
之飴黃煙入皮則有戊巳之靈五神鎮生相轉育  
成服一年者貌如童稚服三年者可作神仙故魯  
定公毋單服此酒以致不死張子聲等皆服得生  
二十餘子享壽三伯多年昔人常云寧得一把五  
加不用金玉滿車寧得一斤地榆不用明月宝珠  
信非長生之藥致是稱乎